

Paciente: **LOYO ARECHANDIETA SALVADOR**
Sexo: **Masculino**
Fecha: **14/11/2015 11:57:20a. m.**Edad: **28 años****Resultados**
Análisis Clínicos

Hoja: 1 de 2

Dirigido a: **DR(A). A QUIEN CORRESPONDA**

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
BÚSQUEDA DE TRES DROGAS EN ORINA				
Anfetaminas/Metanfetaminas		No reactivo		No reactivo
Cannabinoides		No reactivo		No reactivo
Cocaína		No Reactivo		No reactivo

Interpretación de Resultados:

Cualquier resultado por arriba del límite de corte es considerado como Reactivo.

Límite de corte:Anfetaminas/Metanfetaminas: 1000 ng/mL
Cannabinoides : 50 ng/mL
Cocaína: 300 ng/mL

Criterios establecidos según Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMSHA).

NOTAS:

*Las muestras reactivas se almacenan en el laboratorio por dos meses y las muestras no reactivas por tres días.

*Las pruebas en orina para la detección de drogas de abuso se efectúan por un método inmunoenzimático EMIT.

*El presente resultado es presuntivo y solo tiene utilidad clínica. En caso de un resultado "Reactivo" en la prueba presuntiva, debe solicitarse la prueba confirmatoria de la droga en cuestión si éste va a ser utilizado con propósitos legales.

Método: Inmunoensayo enzimático

Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:

**Gracias por su preferencia.****GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.**
SUCURSAL SANTA MARÍAENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ NO. 109 Col. SANTA MARIA LA RIBERA C.P.6400
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL www.chopo.com.mx